

900 6120

CYBER TECH

CT CLEAN

HAND DISINFECTION

Ready to use hand disinfectant alcohol based
for surgical and hygienic hand disinfection.

Desinfectante alcohólico para las manos,
listo para usar, para la desinfección quirúrgica
e higiénica de las manos.

Désinfectant à base d'alcool et prêt à l'emploi
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale
des mains.

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel
zur hygienischen Händedesinfektion.

Disinfettante a base di alcol, pronto per l'uso,
per la disinfezione igienica e chirurgica delle
mani.

Gebruiksklare handdesinfectans op alcohol
basis voor chirurgische en hygiënische hand-
desinfectie.

1 L e



LOT



Danger
Peligro
Danger
Gefahr
Pericolo
Gevaar



DE Healthcare Ltd
Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,
Studland Road, Kingsthorpe,
Northampton NN2 6NE U.K.
Tel: +44 1634 266 056
www.cybertechbrand.com

Rev.2015/05



Indications for use: For hygienic purpose rub the hand thoroughly with the disinfectant and leave for 30 seconds. For surgical purpose the hands and lower arm should be rubbed with the disinfectant and leave for 5 minutes. For disinfection of simple injections and punctures of peripheral vessels, the skin should be thoroughly rubbed with the disinfectant and leave for 1 minute. For skin with sebaceous glands, rub the skin thoroughly and leave for 10 minutes. To act as a coolant mix the solution with equal amount of water before use. Microbiological effectiveness/Efficacy: Bacteria and Candida albicans: Hygiene Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 12791, prEN 12054: concentrated: 30 sec. surgical Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrated: 1 min. TbB (Tuberculosis) in accordance to EN 14348 (high bio load): concentrated: 30 sec. Membrane covered viruses (i.e. HBV, HIV, HCV) in accordance to BGA(RKI)/DVV: concentrated: 15 sec. 100g contains: 62,6 g 2-Propanol. Purified water Safety Precautions: Danger: Highly flammable liquid and vapour. Very irritant eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and明火. Avoid breathing dust/fume/gas/vapours/mist. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Dispose of contents/container to local , regional, national and international regulations.

Instrucciones de uso: Para una desinfección higiénica, frotar las manos a conciencia con el desinfectante y dejar actuar 30 segundos. Para una desinfección quirúrgica, frotar las manos y los antebrazos con el desinfectante y dejar actuar 5 minutos. Para la desinfección en el caso de inyecciones simples y punciones de vasos periféricos, frotar la piel con glándulas sebáceas, frotar la piel a conciencia y dejar actuar durante 1 minuto. Para la piel con glándulas sebáceas, mezclar la solución con una cantidad igual de agua antes de su uso. Eficacia microbiológica/Eficacia: Bacterias y Candida albicans: Desinfección higiénica de las manos conforme a las VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 12791, prEN 12054: concentrado: 30 seg. Desinfección quirúrgica de las manos conforme a la VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrado: 1 min. TbB (Tuberculosis) conforme a la EN 14348 (alta carga biológica): concentrado: 30 seg. Virus envueltos en membrana (a saber: VHB, HIV, HCV) conforme a las BGA (RKI)/DVV: concentrado: 15 seg. 100 g contienen 62,6 g de 2-Propanol. Precauciones de seguridad: Peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor y superficies calientes. Evitar chistar las manos al descubrirse o en otras zonas de ignición. No fumar. Usar guantes de protección/ropa de protección/ropa de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puede hacerse con facilidad. Prosseguir con el lavado. Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/ regional/ nacional/ internacional.

Mode d'emploi: Pour un lavage hygiénique, appliquer le désinfectant sur les mains et frotter vigoureusement, laisser agir pendant 30 secondes. Pour un lavage chirurgical, appliquer le désinfectant sur les mains et les avant-bras et frotter, laisser agir pendant 5 minutes. Pour une désinfection en cas d'injection simple et de la pénétration des vaisseaux périphériques, appliquer le produit sur la peau et frotter vigoureusement, puis laisser agir pendant 1 minute. Pour les peaux grasses, appliquer le produit et frotter vigoureusement, puis laisser agir pendant 10 minutes. Pour une action refroidissante, mélanger volume de solution à un volume d'eau avant utilisation. Microbiologie/Efficacité: Bactéries et Candida albicans: Désinfection hygiénique des mains conformément aux recommandations VAH/ DGHM, et aux normes EN 1500, prEN 12054, EN 12791: 30 sec. Désinfection chirurgicale des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM, et aux normes EN 12791, prEN 12054: 1 min. TbB (Tuberculose) conformément à la norme EN 14348 (charge bio élevée): 30 sec. Virus enveloppés (VHB, VH, HCV) conformément aux normes BGA (RKI)/DVV: 15 sec. 100 g contiennent: 62,6 g 2-Propanol. Eau purifiée, conseil de sécurité: Liquide et vapeurs très inflammables. Risque de somnolence ou vertige. Éviter la chaleur, les surfaces chaudes, des éincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIFOISON/ un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu/recipient conforme à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

Hinweise zur Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten: Bakterien und Candida albicans: Hygienisch Händedesinfektion nach VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 12791: Konz. 30 sec. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 30 sec. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV: Konz. 15 sec. In 100g sind enthalten: 62,6 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser Sicherheitshinweise: Gefahr: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI EINER INHALATION: Die Person in die frische Luft bringen und unter ungezwungenen Bedingungen in eine Position, die für sie eine angenehme Atmung ermöglicht. Anrufen bei Kontakt mit den Augen: Mit Wasser spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Verpackung nur vollständig rest-entleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 0699 entsorgen. VAH/DGHM gelistet. BAUA-Nr. 38648

Istruzioni per l'uso: Applicare il gel e frizione bene le mani. Attendere 30 secondi. Nella applicazioni chirurgiche, applicare il gel su mani e avambracci e frizionare a fondo. Attendere 5 minuti. Per la disinfezione nelle iniezioni o puntura dei vasi periferici, applicare sulla pelle frizzandolo a fondo e attendere 1 minuto. Per la pelle con ghiandole sebacee, applicare sulla pelle e frizzandolo a fondo e attendere 10 minuti. Per la disinfezione refrigerante, miscelare la soluzione con una quantità equivalente d'acqua prima dell'uso. Eficacia microbiologica/Efficacia: Batteri e Candida albicans: Desinfezione igienica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 12791: concentrato: 30 sec. Disinfezione chirurgica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrato: 1 min. TbB (Tuberculosis) secondo EN 14348 (alta carica biologica): concentrato: 30 sec. Virus capsulati (HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DVV: concentrato: 15 sec. 100 g contengono 62,6 g 2-propanol, Acqua depurata. Istruzioni di sicurezza: Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. EN CAS D'INHALATION: trasportare la persona all'esterno e tenerla in una posizione che favorisca la respirazione. EN CASO DI CONTATO CON GLI OCCHI: sciaccuare con cautela per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccuare. Contattare un CENTRO ANTIVeleni/un medico in caso di malessere. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali/regionali.

Indicates voor gebruik: Wrijf de handen om hygiënische redenen grondig in met het desinfectants en laat gedurende 30 seconden inwerken. Voor chirurgische doeleinden dienen de handen en onderarmen ingesmeerd te worden met het desinfectants en dient dit gedurende 5 minuten in te trekken. Voor het desinfecteren van de huid voor simpele injecties en punctie van periferie vaten dient de huid grondig ingewreven te worden met het desinfectants en dient dit gedurende 1 minuut te blijven zitten. Om de huid met gedierte glijvlakken te reinigen moet de huid grondig in te trekken en dient dit gedurende 10 minuten laten zitten. Om dit te gebruiken als koelende middel moet de oplossing voor gebruik mengen met een gelijke hoeveelheid water. Microbiologische doeltreffendheid/Werkzaamheid: Bacteriën en Candida albicans: Hygiënische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 12791, prEN 12054: geconcentreerd: 30 sec. chirurgische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: geconcentreerd: 1 min. TbB (Tuberculosis) conform EN 14348 (hoge biologische belasting): geconcentreerd: 30 sec. Met membraan bedekte virussen (d.w.z. HBV, HIV, HCV) conform BGA(RKI)/DVV: geconcentreerd: 15 sec. 100 g bevat: 62,6 g 2-propanol, Gereinigd water. Veiligheidsinstructies: Gevaar: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelgeelheid veroorzaken. Verwijder de handen van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Gebruik beschermende handschoenen/beschermende kleding/beschermende oogbescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.